



XII CONGRESSO  
NORTE NORDESTE  
DE GERIATRIA E  
GERONTOLOGIA

06 A 08 DE JUNHO DE 2024

Mar Hotel - Recife-PE

Envelhecimento Plural: Diversidade e Inovação



## Demência de Alzheimer precoce em paciente de Caicó-RN: Impacto clínico e funcional dos sintomas comportamentais e psicológicos

Manuel do O de Souto Neto<sup>1</sup>; Aurélio Gomes de Albuquerque Neto<sup>2</sup>; Francisco Belísio de Medeiros Neto<sup>3</sup>; Raphael Fernandes Assis Gadelha Botelho<sup>4</sup>; Cíntia Cavalcante de Oliveira Gomes<sup>5</sup>; Rafael Araújo Medeiros Nóbrega Palmeira<sup>6</sup>; Thaís Araújo dos Santos<sup>7</sup>; Valciclênio Valério Pereira da Costa Macedo<sup>8</sup>

1- Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM)/UFRN, Caicó, RN, Brasil.

### Introdução/Fundamentos

A doença de Alzheimer (DA) é a principal causa de demência na população senil e pré-senil. Uma parcela reduzida de pacientes (10% dos casos) apresenta sua forma precoce (< 65 anos), patologia de rápida progressão com distúrbios que podem afetar funções cognitivas, comportamentais e psicológicas.

### Objetivos

Descrever um caso de Demência de Alzheimer (DA) precoce em uma paciente com sintomas comportamentais e psicológicos da doença, destacando os impactos funcionais e a progressão do quadro clínico.

### Metodologia

Estudo de caso qualitativo realizado em um ambulatório de geriatria, usando registros da clínica-escola da UFRN. Cinco escalas foram utilizadas para avaliar funcionalidade e cognição da paciente: Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional-20, Teste do Relógio, Pfeffer e Escala de Depressão Geriátrica.

### Referências Bibliográficas e Agradecimentos

- CAMELLI P.; BARBOSA, M.T. Como diagnosticar as quatro causas mais frequentes de demência. Rev. Bras. Psiquiatr., 2002, 24(1): 7-10
- ENGELHARDT, E. et al. (2001, dezembro). Doença de Alzheimer e espectroscopia por ressonância magnética do hipocampo. Arq. Neuro-Psiquiatr., 59(4): 865-870, 2001.
- CHAVES, Joceli Corrêa et al. Tratamento farmacológico e assistência psicológica na Doença de Alzheimer. Revista Saúde em Foco, v. 10, p. 963-973, 2018.
- TRUZZI, Annibal; LAKS, Jerson. Doença de Alzheimer esporádica de início precoce. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), v. 32, p. 43-46, 2005.

### Resultados e Discussões

Paciente de 61 anos, professora, casada, diagnosticada com DA precoce há 2 anos, apresentando medo de situações cotidianas, irritabilidade, perda de peso (10 kg) e lapsos de memória. Recebeu prescrição de Galantamina, Olanzapina e Sertralina, com encaminhamento para ressonância magnética (RM). Após reavaliação, relatou melhora funcional e aumento de peso, com achados compatíveis com DA na RM. A terapia foi ajustada, mantendo-se Sertralina e Galantamina. Na última consulta, evidenciou melhora emocional, comunicabilidade e estabilidade cognitiva, com redução da dose de Olanzapina.

### Conclusões

A DA é uma demência que afeta função cognitiva e pode apresentar Sintomas Comportamentais e Psicológicos da Demência (SCPD) e, apesar de ser uma patologia progressiva, um tratamento e acompanhamento bem sucedido pode amenizar sintomas psicossomáticos e trazer qualidade de vida para o paciente.