



CAMPINAS - SP
08 A 11
DE OUTUBRO
2021



16º CONGRESSO
BRASILEIRO DE
CLÍNICA MÉDICA 2021

EVENTO
HÍBRIDO
PRESENCIAL E VIRTUAL

6º Congresso Internacional de
Medicina de Urgência e Emergência

Perfil sociodemográfico de indivíduos acometidos por Leptospirose no estado do Pará

Ruan Davi Rebouças de Sousa¹; Alexandre Gomes dos Santos¹; Caroline Sayuri Lustosa Sato¹; Gabriel Ribas Nascimento de Melo¹
1. Universidade do Estado do Pará (UEPA)

Introdução/Fundamentos

A leptospirose é um grave problema de saúde pública com interesse mundial, sendo que tem elevados impactos socioeconômicos. A doença é muito relacionada com condições sanitárias precárias, atingindo majoritariamente a população da periferia, com menos acesso à informação e ao auxílio do Estado.

Objetivos

Caracterizar o perfil sociodemográfico de indivíduos acometidos por leptospirose no estado do Pará no ano de 2019.

Métodos

Trata-se de um estudo com caráter documental, descritivo, de abordagem quantitativa e transversal, que visou coletar informações relacionadas ao perfil sociodemográfico dos pacientes acometidos por leptospirose no estado do Pará. Os dados são referentes ao período de janeiro a dezembro de 2019 e foram obtidos por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e TABNET/DATASUS. As variáveis incluídas no estudo foram: sexo, raça, escolaridade e faixa etária. Posteriormente as informações foram tabuladas no Microsoft Excel e analisadas por meio da estatística descritiva.

Salienta-se que o presente estudo utilizou dados secundários de acesso público irrestrito, logo, dispensa-se o parecer ético do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), de acordo com as normas estabelecidas na resolução nº466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

Resultados

No ano de 2019, foram notificados 144 casos de leptospirose distribuídos nas 11 regiões de saúde paraenses. A Região Metropolitana I comporta a maioria desses casos (94 casos), seguida da Região Metropolitana III (8 casos) e do Baixo Amazonas (8 casos). No quesito raça tem-se a predominância de pardos (109 casos).

O sexo masculino apresentou 119 casos. A variável escolaridade foi ignorada em 43 registros, seguidos de 20 registros no Ensino Médio e 24 de 5ª a 8ª série. Os casos, em sua maioria, são de adultos, com 55 na faixa etária de 20-39 e 45 na de 40-59.

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
<1 Ano	1	-	1
05-09	2	1	3
10-14	4	2	6
15-19	11	2	13
20-39	53	5	58
40-59	36	13	49
60-64	5	1	6
65-69	6	1	7
70-79	1	-	1
Total	119	25	144

Tabela 1. Casos confirmados de Leptospirose por sexo e faixa etária no estado do Pará no ano de 2019

Conclusões/Considerações Finais

A leptospirose ainda é uma doença prevalente no estado do Pará, e com maior acometimento na população economicamente ativa, o que, além do manejo pelo Sistema Único de Saúde, aumenta o prejuízo de gastos públicos com a enfermidade. Seu maior acometimento na população masculina pode refletir a relação ocupacional dentro de sua transmissão. Por fim, a não disponibilidade de algumas variáveis no DATASUS reflete a desimportância com que alguns serviços de saúde lidam com as notificações de agravo em saúde- uma realidade que precisa ser mudada.

Referências Bibliográficas

- MARTINS, Mário Henrique da Mata; SPINK, Mary Jane Paris. A leptospirose humana como doença duplamente negligenciada no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, p. 919-928, 2020.
- LARA, Jackeline Monsalve et al. Leptospirose no município de Campinas, São Paulo, Brasil: 2007 a 2014. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 22, p. e190016, 2019.
- CHAIBLICH, Juliana Valentim et al. Estudo espacial de riscos à leptospirose no município do Rio de Janeiro (RJ). *Saúde em debate*, v. 41, p. 225-240, 2017.
- MARTELI, Aílce Nardoni et al. Análise espacial da leptospirose no Brasil. *Saúde em Debate*, v. 44, p. 805-817, 2020.



16º CONGRESSO BRASILEIRO
DE CLÍNICA MÉDICA 2021

6º Congresso Internacional de
Medicina de Urgência e Emergência

EVENTO
HÍBRIDO
PRESENCIAL E ONLINE

Campinas, SP - 08 a 11 de outubro/2021