



XII CONGRESSO
NORTE NORDESTE
DE GERIATRIA E
GERONTOLOGIA

06 A 08 DE JUNHO DE 2024

Mar Hotel - Recife-PE

Envelhecimento Plural: Diversidade e Inovação



PREVALÊNCIA DE DELIRIUM EM PACIENTES IDOSOS HOSPITALIZADOS POR INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Francisco, Camila Pereira Fiorotto¹; Serra, Kuezia da Veiga Gonzales²; Carneiro; Marília Mulatino²; Melo, Raquel Barbosa³; Borges, Carla Nubia Nunes

1.Faculdade de Ciências Médicas/AFYA, Jaboatão dos Guararapes, PE; 2.Universidade Católica de Pernambuco; 3.Uninassau Boa Viagem, Recife – PE. 4. Médica Geriatria com título de especialista pela SBGG e AMB

Introdução/Fundamentos

O delirium é uma síndrome clínica que resulta em uma mudança na consciência, na cognição e na flutuação da atenção em um curto período de tempo. Esse distúrbio, muitas vezes reversível, possui etiologia multifatorial e apresenta como principal fator desencadeante as infecções do trato urinário (ITU), muitas vezes sendo uma condição subdiagnosticada em idosos internados.

Objetivos

O objetivo do presente estudo é analisar a ocorrência de delirium em idosos hospitalizados por infecção do trato urinário.

Metodologia

As informações contidas neste trabalho foram obtidas por meio de uma revisão integrativa da literatura. Para tal, realizou-se uma consulta nas bases de dados eletrônica Pubmed, Scielo e Lilacs. Com critérios de inclusão: artigos publicados entre os anos de 2020 a 2024, e utilizados os descritores: Idosos; Infecção do Trato Urinário e Delirium.

Referências Bibliográficas

Rieck KM, Pagali S, Miller DM. Delirium in hospitalized older adults. *Hosp Pract (1995)* 2020;48:3–16.

Rodriguez-Mañas L. Infecções do trato urinário em idosos: uma revisão das características da doença e das opções atuais de tratamento. 2020; 9 :2020–2024.

Billig AE, Lampert MA, Guerra RR, Steigleder NE. Delirium in the elderly admitted to an emergency hospital service. *Rev Bras Enferm.* 2022;75.

Resultados e Discussões

Os artigos analisados demonstram maior prevalência de delirium em pacientes hospitalizados por ITU, sendo em sua maioria do sexo feminino e com idade média de 70 anos. Em 5 dos 7 estudos, foi evidenciado que práticas invasivas, como a sondagem vesical de demora, pioram potencialmente o prognóstico desses pacientes, tendo como uma de suas consequências quadros agudos de delirium hipotativo.




Figura 1. Prevalência de delirium e formas de apresentação em idosos

Fonte: Elaboração própria

Conclusões

De acordo com a temática abordada, demonstra-se dificuldade de diagnóstico de delirium nos pacientes septuagenários quando diante de ITU, por tal condição confundir-se com alterações clínicas esperadas nessa faixa etária.