



16º CONGRESSO  
BRASILEIRO DE  
CLÍNICA MÉDICA 2021

EVENTO  
HÍBRIDO  
PRESENCIAL E VIRTUAL

6º Congresso Internacional de  
Medicina de Urgência e Emergência

CAMPINAS - SP  
08 A 11  
DE OUTUBRO  
2021

## Título: ANTABUSE-LIKE DEVIDO AO USO DE GLICLAZIDA.

Hamilton Nere Moraes Junior, Bruno Toniazzo,  
Bruna Vanessa Nunes, Sarah Tucci de Biaso, Thiago  
Buriel Fontes.

1.Hospital Do Servidor Público Municipal – HSPM -SP

### Introdução/Fundamentos

O efeito antabuse se refere à hipersensibilidade ao álcool que ocorre como uma reação adversa a medicações específicas. Os sintomas variam de reações cutâneas, sensação de mal estar, náuseas, vômitos, depressão respiratória, arritmias cardíacas e convulsões. A Gliclazida é uma sulfoniúria de segunda geração comumente utilizada para o tratamento de Diabetes Mellitus, que tem como efeitos colaterais comuns hipoglicemia e ganho de peso. Foi referido pela paciente efeito adverso incomum desse medicamento, tipo disulfiram símile ao álcool (antabuse), após uso de Gliclazida, tal efeito adverso é mais comum com uso de Glibenclamida, porém todas as drogas dessa classe tem este potencial efeito adverso.

### Objetivos

Atentar para possíveis efeitos adversos muito pouco frequentes e pouco descritos na prática clínica, relatando um caso de reação adversa atípica da Gliclazida no ambulatório de clínica médica.

### Métodos

T.F.M., 68 anos, em acompanhamento no ambulatório de clínica médica diabética, hipertensa, dislipidêmica, obesa (IMC:31,7), etilista social, hipotireoidia, em uso prévio de Losartana 50mg 1 cp ao dia, PuranT4 75mcg, sinvastatina 20mg, alopurinol 300mg e anlodipino 5 mg.

Ao iniciar tratamento com Gliclazida, paciente evolui com tontura, mal estar, turvação visual, edema e hiperemia de face, palpitações, dificuldade para dormir e inquietude diurna, sintomas relacionados ao uso esporádico não quantificado de álcool. Após suspensão da medicação e substituição por inibidor do SGLT2, paciente evolui com melhora clínica e remissão total dos sintomas. Havendo então a hipótese diagnóstica de antabuse-like devido ao uso da Gliclazida.

### Conclusões/Considerações Finais

Gliclazida possui como manifestação adversa rara e pouco descrita efeito tipo antabuse-like ao álcool.

Apesar de rara essa manifestação pode ocorrer e acarretar complicações graves caso não seja feita a hipótese de forma precoce.

Foi o que ocorreu com o caso em questão e houve melhora clínica com a suspensão da droga e modificação dos hipoglicemiantes.

### Referências Bibliográficas

1-Cecil Medicina Interna. Saunders- Elsevier, 2012. 12. McPHEE, Stephen J.; PAPADAKIS, Maxine A.

2-KASPER, Dennis L. Medicina interna de Harrison. 19 ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2017.

3-PORTO, Celmo Celso. Semiologia médica. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.



16º CONGRESSO BRASILEIRO  
DE CLÍNICA MÉDICA 2021

6º Congresso Internacional de  
Medicina de Urgência e Emergência

Campinas, SP - 08 a 11 de outubro/2021

EVENTO  
HÍBRIDO  
PRESENCIAL E ONLINE