

## RELATO DE CASO: APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE UMA ARTRITE GONOCÓCICA

Ana Luiza Carneiro de Freitas; Rafaela Mineiro Oliveira de Souza; Fernanda Sant'Anna Costa; Leonardo Gusmão Ramos; Thais Gomes Colodetti  
Hospital Rio Doce – Linhares – Espírito Santo

### Introdução/Fundamentos

Infecção gonocócica disseminada (IGD) é um tipo de artrite infecciosa causada pela bactéria *Neisseria gonorrhoeae*, que por disseminação desse patógeno via hematogênica, através da superfície de mucosa infectada pode levar a sintomas articulares, lesões cutâneas e tenossinovite. A presença de febre com calafrios e adinamia podem ocorrer na fase aguda da IGD. Há destruição rápida das estruturas articulares, se não diagnosticado a tempo e instituído o tratamento precoce. Predomina em pacientes com menos de 40 anos de idade, no entanto, pode acometer qualquer faixa etária. Há uma estimativa que a IGD incida em 0,5% a 3% dos infectados pela *N. gonorrhoeae*. O diagnóstico se presume identificar a bactéria por meio de teste molecular e cultura. Se porventura as amostras forem negativas, pôde-se presumir o diagnóstico com base na apresentação clínica consistente, excluindo outras causas e resposta satisfatória a terapia instituída. Em referência ao prognóstico, os dados são limitados, todavia a detecção precoce da infecção e tratamento ágil, são responsáveis pela diminuição ou nenhuma sequela articular do paciente acometido.

### Objetivos

O propósito é elucidar a importância do diagnóstico precoce a fim de diminuir as sequelas geradas pela infecção gonocócica disseminada.

### Métodos

As informações desse relato de caso foram obtidas por meio de revisão de prontuário

### Resultados

Embora a apresentação típica das artrites infecciosas seja monoarticular, não podemos descartar diante de uma apresentação migratória oligo/poliarticular. Logo diante da suspeita de uma IGD o tratamento deverá ser instituído precoce a fim de não gerar destruições articulares.



Figura 1. Artrite Gonocócica

### Conclusões/Considerações Finais

Embora a apresentação típica das artrites infecciosas seja monoarticular, não podemos descartar diante de uma apresentação migratória oligo/poliarticular. Logo diante da suspeita de uma IGD o tratamento deverá ser instituído precoce a fim de não gerar destruições articulares.

### Referências Bibliográficas

<https://www.uptodate.com/contents/disseminated-gonococcal-infection>