

## **Câncer de Colo de Útero em Gestante: Relato de caso**

**Introdução:** Para o diagnóstico inicial do câncer de colo de útero, os sintomas mais frequentes são sangramento vaginal, dor pélvica, lombalgia, anemia crônica e dispneia. Assim que confirmado, o tratamento desta doença em gestantes é individualizado de acordo com o estadiamento, idade gestacional e desejo materno. Durante o primeiro trimestre, recomenda-se a interrupção da gravidez, porém caso a paciente opte por mantê-la, é possível adotar uma terapia neoadjuvante anteriormente ao parto. Vale destacar que prioriza-se a cesárea, visto que um parto vaginal oferece maiores chances de hemorragia, obstrução do canal cervical, além de recidiva da doença.

**Objetivos:** Relatar um caso de uma paciente gestante de 19 semanas que recebeu o diagnóstico de câncer de colo de útero e foi capaz de receber tratamento e garantir a segurança de seu filho.

**Delineamento e métodos:** Relato de Caso

**Resultados:** Paciente de sexo feminino, 33 anos, G3P2, com idade gestacional de 19 semanas apresentou-se em consulta médica com queixa de metrorragia, sinusorragia e dispareunia. Foi submetida à colposcopia, que indicou lesão que atinge a endocérvice, hemorragia da mucosa facilmente induzida, cervicite purulenta e corrimento amarelo. Leucoplasia e neoplasia invasiva foram dadas como diagnóstico, em seguida sendo colhidas três biópsias para análise. O anatomopatológico constatou carcinoma epidermóide moderadamente diferenciado não ceratinizante, infiltrando lâmina própria, além de ausência de invasão angiolímfática e/ou perineural. A paciente se encontrava no estágio IB1. Para o tratamento, foi realizada uma quimioterapia neoadjuvante (NACT) a fim de atrasar a evolução da doença até que se atingisse maturidade fetal suficiente.

**Considerações finais:** Após o diagnóstico da neoplasia, o tratamento de escolha precisou levar em consideração o desejo da paciente. Visto que a opção selecionada fora o seguimento da gravidez, foi necessário realizar temporariamente uma terapia neoadjuvante para que, posteriormente ao parto, a paciente recebesse o tratamento adequado e se curasse.

**Palavras Chave:** Câncer de Colo de Útero, Gestação.

### **Referências bibliográficas:**

CARVALHO, C. M. *et al.* Aspectos clínicos do câncer durante o período gestacional: desafios diagnósticos e terapêuticos. **Rev. Femina**. Minas Gerais, v. 50, n. 10, p. 582-588. Jul. 2022. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1414413>. Acesso em: 26 jul. 2023.

BOLDRINI, N. A. T. *et al.* Câncer do colo do útero na gravidez. **Rev. Femina**. Minas Gerais, v. 47, n. 1, p. 55-60. Jan. 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1046493>. Acesso em: 26 jul. 2023.